

Comment participer ?

Les couples ou les nids de busards se repèrent lors des passages en tracteur dans les parcelles ou en observant les allers et retours des parents au nid.

Les outardes et les œdicnèmes sont plus discrets.

Si vous observez l'une de ces espèces sur vos parcelles juste avant leur récolte, ou si vous repérez un nid, n'hésitez pas à appeler l'animateur du site :



Damien ROY
Chambre d'agriculture de Charente
Antenne de Segonzac
05 45 36 34 00 – 06 07 76 76 29
damien.roy@charente.chambagri.fr

Site internet : <http://barbezieresgourville.n2000.fr/>

En concertation avec vous, le nid sera localisé puis sa protection sera assurée grâce à la pose d'un jalon ou avec la mise en place d'une protection.




© Fabien MERCIER



© <http://rapaces.lpo.fr>



© rapaces-lpo.fr



Participez à la protection des nichées des oiseaux de plaine

Plaine de Barbezières à Gourville



Participez à la protection des nichées des oiseaux de plaine

Le cortège des oiseaux de plaines est le plus menacé en Europe. Une des causes de cette régression est que ces oiseaux nichent au sol et qu'ils sont donc exposés à différentes menaces : outre les prédateurs naturels et les chiens et chats errants, les pratiques agricoles constituent également une menace importante pour les nichées.

- Ainsi les fauches de luzernes et autres cultures fourragères sont généralement effectuées entre la mi-mai et la fin juin, en pleine période de nidification de l'outarde : femelles et jeunes restent tapis dans le nid et sont détruits.
- Les busards s'installent dans les blés ou les orges. Les jeunes, non volants, sont encore très vulnérables au moment des moissons.
- Les nids d'Édicnème, surnommé Courlis de terre, peuvent eux être détruits lors de désherbages mécaniques dans les cultures de printemps ou la vigne.

AFIN DE LIMITER CES PERTES, L'IMPLICATION DES AGRICULTEURS POUR LA PROTECTION DES NICHÉES EST PRIMORDIALE

Le Busard cendré et le Busard Saint-Martin


Ces rapaces sont de bons alliés pour les cultures car ils se nourrissent principalement de petits rongeurs (Campagnol des champs) et d'insectes.

Le busard cendré, migrateur transsaharien, est présent uniquement d'avril à septembre et hiverne en Afrique. Le busard Saint-Martin est sédentaire donc présent toute l'année.

Les pontes au cœur des champs de céréales ont lieu en mai et l'envol des jeunes en juillet. En Poitou-Charentes, 50 à 75 % des nichées peuvent être détruites lors des moissons chaque année !



Busard Saint-Martin femelle*



Busard cendré mâle



Nid de Busard cendré © Fabien MERCIER

*Thierry Degen-DREAL Poitou-Charentes

Définition d'une stratégie de protection avec l'exploitant

Localisation des nids

Intervention juste avant les moissons

Avril Mai Juin Juillet Août

L'Outarde canepetière

Cette espèce migratrice se nourrit principalement de végétaux lorsqu'elle est adulte mais les petits ont besoin d'énormément d'insectes pour grandir tels que les sauterelles, criquets et coléoptères.

Le mâle chante et parade sur des terrains découverts alors que la femelle, très discrète, niche dans des parcelles avec une végétation haute (30-50 cm).

Les pontes peuvent avoir lieu de mai à août mais la majorité a lieu entre la mi-juin et la mi-juillet. L'incubation dure 20 jours et les petits peuvent voler à l'âge d'un mois.



Outarde mâle *



Outarde femelle*



Nid d'outarde – outarde.lpo.fr


Localisation des nids
Protection des nids en concertation avec l'exploitant

Avril Mai Juin Juillet Août

L'Édicnème criard

Migrateur, l'Édicnème est présent de mars à mi-novembre. Il niche principalement d'avril à juin en s'installant sur du sol nu (cultures de printemps, jachère). Le nid est une simple dépression de terre. Il se nourrit d'insectes (coléoptères, orthoptères), de vers de terre et de mollusques.

Discret et peu actif le jour, il se repère au crépuscule et la nuit grâce à ses cris qui portent loin.



Nid d'Édicnème criard © Fabien MERCIER



Édicnème criard © T GUYOT



Édicnème criard © Pascal Alexandre

Localisation du nid, pose d'un jalon pour le repérer

Avril Mai Juin Juillet Août